

# Bula do Sulfato de Minoxidil

## Introdução

O Minoxidil é uma loção capilar de uso local para queda de cabelos e alopecia androgênica (calvície).

**Composição:** Minoxidil 2% ou 5%, Propilenoglicol 10% e Álcool 100ml.

## Indicação

O Minoxidil 2% e 5% é indicado para o tratamento da calvície em adultos, estabilizar queda de cabelos e promover o crescimento capilar.

## Contra-indicações

Ele é contra indicado em pacientes:

- Alérgicos a algum componente da fórmula ou que possui hipersensibilidade a eles.
- Pacientes com feridas ou alguma irritação e alergia no couro cabeludo.
- Mulheres durante a gravidez ou durante a amamentação sem consultar o médico antes.
- Utilizando algum outro medicamento de uso tópico como a tretinoína ou ditranol junto com minoxidil.

**Advertência:** Em caso de superdosagem ou contato com os olhos, lave o local com água corrente.

## Efeitos Colaterais

O uso local do Minoxidil não há evidências que comprove algum efeito sistêmico, porém em casos de alta dosagem ou hipersensibilidade do produto, podem apresentar efeitos tais como: Palpitação, dor em aperto, vertigem, aumento de peso, suor nas mãos e pés, inchaços e debilidade.

Os efeitos colaterais já relatos são crescimento de cabelo em local indesejado, aumento da perda de cabelo nas primeiras semanas de uso, coceira, reação alérgica no local e couro cabeludo descamando.

## Modos de uso

Não é necessário lavar os cabelos antes de utilizar o Minoxidil nos cabelos. Se for lado, estão proibidos xampus com silicone.

Depois de aplicado no cabelo, deve permanecer pelo menos 4 horas com o medicamento no local.

Não pode usar géis, sprays, cremes ou pomadas.

Para o medicamento apresentar melhores resultados deve ser usado durante no mínimo 4 meses. Esse é o tempo necessário para obter resultados satisfatórios.

